

## PROGRAMME DE COLLE DE PHYSIQUE

Semaine du 12/11 au 16/11

### Th 6 a - Bilans enthalpiques en physique - (exercices)

- Savoir effectuer des bilans enthalpiques pour des systèmes diphasés.
- Calorimétrie : principe d'un calorimètre, valeur en eau d'un calorimètre, mesure de la capacité thermique d'un métal par la méthode des mélanges.

**Savoir refaire tous les exercices et les exemples traités en cours.**

Extrait du programme :

Notions et contenus	Capacités exigibles
<b>Bilans enthalpiques</b>	
Enthalpie d'un système monophasé, capacité thermique à pression constante dans le cas du gaz parfait ou d'une phase condensée incompressible et indilatable.	Définir l'enthalpie d'un système. Exprimer le premier principe sous la forme d'un bilan d'enthalpie dans le cas d'une transformation monobare avec équilibre mécanique dans l'état initial et dans l'état final.
Enthalpie de changement d'état d'un corps pur	Connaître le vocabulaire des changements d'état et le diagramme $(P, T)$ . Comparer les ordres de grandeurs des variations d'enthalpie des systèmes monophasés avec celles des changements d'état d'un corps pur. Calculer l'énergie récupérable lors d'un changement d'état d'un corps pur à pression constante.

### Th 6 b - Bilans enthalpiques pour les systèmes sièges de réactions chimiques (exercices)

On considère des systèmes sièges d'une réaction chimique,  $\sum_i \nu_i A_i = 0$ , en évolution monobare avec équilibre mécanique dans l'état initial et dans l'état final :

$$Q = \Delta H$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{si } \Delta H > 0 \quad \text{la réaction est endothermique} \\ \text{si } \Delta H < 0 \quad \text{la réaction est exothermique} \\ \text{si } \Delta H = 0 \quad \text{la réaction est athermique} \end{array} \right.$$

- Enthalpie standard de réaction  $\Delta_r H^\circ(T)$ .
- Le bilan enthalpique, pour un système siège d'une réaction chimique évoluant d'un état  $(T, P, \xi_i = 0)$  vers un état  $(T, P, \xi = \xi_f)$  s'exprime sous la forme :

$$\Delta H = \Delta_r H^\circ \xi_f$$

- Enthalpie standard de formation  $\Delta_f H^\circ$ . Savoir calculer une enthalpie standard de réaction à partir des enthalpies standard de formation des réactants par la loi de Hess :

$$\Delta_r H^\circ = \sum_i \nu_i \Delta_f H_i^\circ$$

- Température de flamme : savoir calculer la température maximale atteinte dans l'hypothèse d'une transformation adiabatique, en effectuant d'abord le bilan de matière complet (en tenant compte de la présence éventuelle de constituants n'intervenant pas dans la réaction) et ensuite le bilan enthalpique.

Extrait du programme :

<b>Bilans enthalpiques</b>	
Enthalpie standard de réaction	Effectuer un bilan de matière lors d'une réaction chimique. Évaluer la température atteinte par un système siège d'une transformation chimique supposée isobare et réalisée dans un réacteur adiabatique.

### Th7 - Second principe de la thermodynamique (cours)

- Exemples d'évolutions irréversibles.
- Les causes de l'irréversibilité : effets dissipatifs (frottements, effet Joule), inhomogénéités (de température, de pression, de concentration...)
- Transformation réversible.
- Second principe :

À tout système à l'équilibre thermodynamique on peut associer une **fonction d'état extensive**  $S$  appelée **entropie**.

Si, lors d'une transformation d'un **système fermé**, d'un état d'équilibre (1) vers un état d'équilibre (2), le système reçoit des transferts thermiques  $Q_i$  lors de la mise en contact avec des thermostats de température  $T_{\text{ext}_i}$ , la variation d'entropie vérifie l'inégalité :

$$\Delta S \geq \sum_i \frac{Q_i}{T_{\text{ext}_i}}.$$

**L'égalité est réalisée lorsque la transformation est réversible.** Dans ce cas, lors de chaque transfert thermique la température du système est égale à la température du thermostat avec lequel il est en contact :  $T_i = T_{\text{ext}_i}$  d'où, pour une transformation réversible :

$$\Delta S = \sum_i \frac{Q_i^{\text{rev}}}{T_i}$$

- Transformation adiabatique réversible :  $\Delta S = 0$ . **Une transformation adiabatique réversible est une isentropique.**
- Variation d'entropie d'un gaz parfait ; variation d'entropie d'une phase condensée idéale (ces expressions n'ont pas à être connues et doivent être fournies si nécessaire).
- Transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait : lois de Laplace  $PV^\gamma = \text{cte}$ . Savoir passer aux deux autres expressions  $TV^{\gamma-1} = \text{cte}$  et  $P^{1-\gamma}T^\gamma = \text{cte}$ .
- Entropie de changement d'état. Lien entre entropie de changement d'état et enthalpie de changement d'état.
- Diagrammes  $(T, s)$  ; diagrammes  $(h, s)$ .